

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

▲ соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, приобретать корма из благополучных территорий и проводить их термическую обработку

▲ регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных, хранения и приготовления кормов



▲ систематически проводить дератизацию и дезинсекцию

не приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов

всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной службы и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в основное стадо



обеспечить проведение предубойного осмотра животного ветеринарным специалистам

ВНИМАНИЕ

В случае заболевания или гибели животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание – в течении 24 часов извещать специалистов государственной ветеринарной службы



КОНТАКТЫ:

Инспекция ветеринарии и государственного надзора в области обращения с животными Владимирской области

8(4922) 77-16-79

Служба ветеринарии Ивановской области

8(4932) 33-26-38

Управление ветеринарии Костромской области

8(4942) 55-33-03

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д.2

8(4922)77-16-64

г. Кострома, пр-кт Мира, д.53А

8(4942)37-01-75

г. Иваново, ул. Молодых Рабочих, д.1

8(4932)93-95-91

Дежурный тел.: 8(910)180-08-68

Адрес электронной почты:
rshn8@fsvps.gov.ru



РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской областям



ПАМЯТКА

ЯЦЦУР

О заболевании



Ящур — высококонтагиозная вирусная болезнь парнокопытных и млекопитающих. Известно 7 серотипов вируса. Животные, переболевшие вирусом ящура одного типа, могут заболеть вирусом ящура другого серотипа

Наиболее восприимчивы к ящурю крупный рогатый скот и свиньи; овцы, козы и дикие копытные животные — менее чувствительны

На восприимчивость животных к ящурю существенное влияние оказывает возраст. Молодые животные более восприимчивы и болезнь может протекать тяжелее, чем у взрослых. Другие виды животных заболевают ящуром довольно редко

Возбудителем ящура является РНК-содержащий вирус семейства Picornaviridae рода Aphthovirus

Инкубационный период болезни в среднем составляет 14 календарных дней

Пути передачи вируса

Передача вируса осуществляется воздушно-капельным, контактным, алиментарным и ятрогенным путями. Факторами передачи вируса являются продукция животного происхождения, корма, одежда и обувь персонала, обслуживающего восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, контаминированные вирусом

Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. У лиц, контактирующих с больными животными, возможна передача инфекции при доении, уходе, лечении, убое, воздушнокапельный путь заражения, а также через предметы, загрязненные их выделениями



Следует помнить, что во избежание инфекционных и паразитарных болезней, общих для человека и животных, нельзя приобретать мясо, молоко и другую продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарной справки на продукцию

Клинические признаки

КРС:

Лихорадка, саливация, хромота, везикулярные поражения на слизистой оболочке ротовой полости и языка, на коже в области венчика и межкопытцевой щели, на вымени

Свиньи:

Хромота, везикулярные поражения на кожных покровах венчика, межкопытцевой щели, пяточке, молочных железах, слизистой оболочке ротовой полости и языка, спадание рогового башмака. Поросята-сосунки гибнут без видимых клинических признаков

Мелкие жвачные:

Хромота (афты в области межкопытцевой щели и венчика), везикулярные поражения на слизистой оболочке ротовой полости и языка. Саливация слабо выражена

Люди:

болезнь начинается с сильного озноба, подъема температуры до 39-40°, головной боли, потери аппетита, мышечных болей, особенно в области поясницы. Уже в первые сутки больной ощущает сухость и жжение во рту, сильное слюнотечение. Затем появляются пузырьковые высыпания от 1 до 3 мм диаметром. Особенно их много на кончике и по краям языка, а также на слизистой оболочке щек, на деснах и губах. Содержимое пузырьков прозрачно, желтоватого цвета, затем мутнеет, пузырьки увеличиваются, образуя эрозии



При обнаружении ящура на неблагополучные хозяйства или населенный пункт накладывают карантин, определяют угрожаемую по ящурю зону, вводят ограничения в хозяйственной деятельности на территории района, области